



مرحله	نام کود	نوع کود	نوع و میزان مصرف	
			کود آبیاری	محلول پاشی
پس از استقرار نشاء (آبیاری اول)	۱۰-۵۰-۱۰	عناصر پر مصرف+ریز مغذی	۱۰ تا ۲۰ کیلوگرم در هکتار	-----
	بلک ایگل (هیومیک اسید پودری)	مواد آلی + نیتروژن+پتاسیم	۱ تا ۳ کیلوگرم در هکتار	-----
	هیومی توپیا (هیومیک اسید مایع)	هیومیک اسید +فولویک اسید + پتاسیم	۵ تا ۱۰ لیتر در هکتار	-----
	اسپشیاال ۱۵-۴۵-۵	عناصر پر مصرف + ریز مغذی	۱ تا ۳ کیلوگرم در هکتار	-----
	آمینو پلکس ۲۴(آمینو اسید مایع)	آمینو اسید + نیتروژن ارگانیک	۱ تا ۱/۵ لیتر در هکتار	-----
	آمینو پلکس ۷۰(آمینو اسید پودری)	آمینو اسید + نیتروژن	۳۰۰ تا ۶۰۰ گرم در هکتار	-----
	پرو روت (ترکیب محرک رشد ریشه)	نیتروژن + فسفر محلول + پتاسیم + اسید آمینه آزاد	۱ لیتر در هکتار	۱ تا ۲ لیتر در هکتار
	گلدن ایگل (ترکیب محرک رشد)	(آمینو اسید مایع + ATCA)	۲۵۰ تا ۵۰۰ سی سی در هکتار	-----
	اسپشیاال ۱۷-۱۷-۱۷	عناصر پر مصرف + ریز مغذی	۱ تا ۳ کیلوگرم در هکتار	-----
	۲۹-۱۰-۱۰	عناصر پر مصرف+ریز مغذی	۲ تا ۳ کیلوگرم در هکتار	-----
	آرگو پلکس (کود آلی غنی شده با محرک رشدی و ویتامین)	نیتروژن + پتاسیم + کربن آلی	۵ تا ۱۰ لیتر در هکتار	-----
	۲۰-۲۰-۲۰	عناصر پر مصرف+ریز مغذی	۱۰ تا ۲۰ کیلوگرم در هکتار	-----
	پرو شوک (ترکیب موثر بر تنش های محیطی)	نیتروژن + آمینو اسید آزاد+ ماده آلی + کربوکسیلیک اسید+ فولویک اسید	۱ تا ۳ لیتر در هکتار	۰/۵ تا ۱ لیتر در هکتار



مرحله	نام کود	نوع کود	نوع و میزان مصرف	
			محلول پاشی	کود آبیاری
مرحله اولیه رشد	۱۰-۱۰-۲۹	عناصر پر مصرف+ریز مغذی	-----	۱۰ تا ۲۰ کیلوگرم در هکتار
	بلک ایگل (هیومیک اسید پودری)	مواد آلی + نیتروژن + پتاسیم	-----	۱ تا ۳ کیلوگرم در هکتار
	هیومی توپیا (هیومیک اسید مایع)	هیومیک اسید + فولویک اسید + پتاسیم	-----	۵ تا ۱۰ لیتر در هکتار
	آمینو پلکس ۷۰ (آمینو اسید پودری)	آمینو اسید + نیتروژن	۳۰۰ تا ۶۰۰ گرم در هکتار	-----
	اسپیشال ۱۰-۱۰-۲۶	عناصر پر مصرف+ریز مغذی	۱ تا ۳ کیلوگرم در هکتار	-----
	کلسیم	کلسیم مایع غنی شده	۱ تا ۱/۵ لیتر در هکتار	-----
	کلسی بُر	کلسیم بصورت کربوکسیلیک + بُر	۱ تا ۲ کیلوگرم در هکتار	-----
	تراپلکس کلسی ماگ (نیترات کلسیم + منیزیم)	نیتروژن + کلسیم + منیزیم	-----	۱۰ تا ۲۰ کیلوگرم در هکتار
	CN (نیترات کلسیم)	نیترات کلسیم	-----	۱۰ تا ۲۰ کیلوگرم در هکتار



مرحله	نام کود	نوع کود	نوع و میزان مصرف	
			کود آبیاری	محلول پاشی
قبل از گلدهی	پی کی (فسفر + پتاسیم)	تامین پتاسم و فسفر بصورت فسفیت	۴ تا ۵ لیتر در هکتار	۲ تا ۳ لیتر در هکتار
	تراپلکس MKP (مونو پتاسیم فسفات)	فسفر محلول + پتاسیم	۱۰ تا ۲۰ کیلوگرم در هکتار	-----
	آمینو پلکس ۷۰ (آمینو اسید پودری)	آمینو اسید + نیتروژن	۰/۵ تا ۱/۵ کیلوگرم در هکتار	۳۰۰ تا ۶۰۰ گرم در هکتار
	آمینو پلکس ۲۴ (آمینو اسید مایع)	آمینو اسید + نیتروژن ارگانیک	-----	۱ تا ۱/۵ لیتر در هکتار
	میکرو	آهن + روی + منگنز + سایر ریز مغذی ها بصورت کلات EDTA	-----	۱ تا ۲ کیلوگرم در هکتار
	کراپ پیست (کود ژله ای)	عناصر پر مصرف ۶۱-۰-۱۲	۵ تا ۱۵ کیلوگرم در هکتار	۰/۵ تا ۱ کیلوگرم در هکتار

مرحله	نام کود	نوع کود	نوع و میزان مصرف	
			کود آبیاری	محلول پاشی
بعد از گل به میوه	کلاستر (آمینو اسید + مواد آلی)	نیتروژن + آمینو اسید آزاد + مواد آلی)	-----	۲۵۰ سی سی در هکتار
	مولتی	نیتروژن + فسفر + ریز مغذی بر پایه فسفیت	-----	۱ تا ۱/۵ لیتر در هکتار
	آمینو پلکس ۲۴ (آمینو اسید مایع)	آمینو اسید + نیتروژن ارگانیک	-----	۱ تا ۱/۵ لیتر در هکتار
	آمینو پلکس ۷۰ (آمینو اسید پودری)	آمینو اسید + نیتروژن	۰/۵ تا ۱/۵ کیلوگرم در هکتار	۳۰۰ تا ۶۰۰ گرم در هکتار



مرحله	نام کود	نوع کود	نوع و میزان مصرف	
			محلول پاشی	کود آبیاری
درشت شدن میوه (مرحله نفوذی شدن میوه)	کلسیم	کلسیم مایع غنی شده	۱ تا ۱/۵ لیتر در هکتار	-----
	۱۲-۱۲-۳۶	عناصر پر مصرف + ریز مغذی	-----	۱۰ تا ۲۰ کیلوگرم در هکتار
	اسپیشال ۵-۵-۳۰	عناصر پر مصرف + ریز مغذی	۱ تا ۳ کیلوگرم در هکتار	-----
	آمینو پلکس ۲۴ (آمینو اسید مایع)	آمینو اسید + نیتروژن ارگانیک	۱ تا ۱/۵ لیتر در هکتار	-----

مرحله	نام کود	نوع کود	نوع و میزان مصرف	
			محلول پاشی	کود آبیاری
درشت شدن میوه (مرحله شیشه ای شدن یا رنگ)	کراپ پیست (کود زله ای)	عناصر پر مصرف ۱۲-۰-۶۱	-----	۵ تا ۱۵ کیلوگرم در هکتار
	بوستر (میکروگرانول پتاسیم)	پتاسیم + فسفر محلول	۱ تا ۳ کیلوگرم در هکتار	-----
	NOP	نیترات پتاسیم + گوگرد	-----	۱۰ تا ۲۰ کیلوگرم در هکتار
	SOP (سولوپتاس)	(پتاسیم + گوگرد)	۲ تا ۳ کیلوگرم در هکتار	۱۰ تا ۲۰ کیلوگرم در هکتار



🍅 مقادیر توصیه شده بسته به سن گیاه، زمان مصرف، وضعیت خاک، شدت کمبود، و میزان عملکرد متغیر بوده و برای اثربخشی بالاتر و حصول بهترین نتیجه، توصیه می گردد قبل از مصرف، انجام آزمایش آب، خاک و گیاه صورت گیرد.

🍅 محلول پاشی بایستی در هوای آرام، صبح زود یا هنگام غروب انجام گیرد تا بیشترین کارایی را داشته باشد.

🍅 در صورت نیاز به اختلاط با سایر کودها و سموم، ابتدا در سطح کوچک آزمایش شود.

تهیه شده در بخش فنی شرکت آدنا دشت

تابستان ۱۴۰۱