



مرحله	نام کود	نوع کود	نوع و میزان مصرف	
			محلول پاشی	کود آبیاری
بستر کشت	تراکت (ترکیب گرانوله خاک مصرف حاوی عناصر ماکرو و میکرو)	با تکنولوژی DMPP	-----	۱۰۰ تا ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار

مرحله	نام کود	نوع کود	نوع و میزان مصرف	
			محلول پاشی	کود آبیاری
انتقال نشاء	پرو روت (ترکیب محرک رشد ریشه)	نیتروژن + فسفر محلول + پتاسیم + اسید آمینه آزاد	۱ تا ۲ لیتر در هکتار	۱ لیتر در هکتار

مرحله	نام کود	نوع کود	نوع و میزان مصرف	
			محلول پاشی	کود آبیاری
۳۰ روز پس از انتقال نشاء	۱۸-۴۴ (اوره فسفات)	نیتروژن به فرم اوره + فسفر محلول	۲ تا ۳ کیلوگرم در هکتار	۱۰ تا ۲۰ کیلوگرم در هکتار
	۱۰-۵۰-۱۰	عناصر پر مصرف + ریز مغذی	۲ تا ۳ کیلوگرم در هکتار	۱۰ تا ۲۰ کیلوگرم در هکتار
	بلک ایگل (هیومیک اسید پودری)	مواد آلی + نیتروژن + پتاسیم	۱ تا ۳ کیلوگرم در هکتار	-----



مرحله	نام کود	نوع کود	نوع و میزان مصرف	
			محلول پاشی	کود آبیاری
۴ تا ۶ برگی	CN (نیترات کلسیم)	نیترات کلسیم	۲ تا ۳ کیلوگرم در هکتار	۱۰ تا ۲۰ کیلوگرم در هکتار
	کلسی ماگ (نیترات کلسیم + منیزیم)	نیتروژن + کلسیم + منیزیم	۱۰ تا ۲۰ کیلوگرم در هکتار	-----

مرحله	نام کود	نوع کود	نوع و میزان مصرف	
			محلول پاشی	کود آبیاری
سه هفته بعد	۱۲-۱۲-۳۶	عناصر پر مصرف + ریز مغذی	۲ تا ۳ کیلوگرم در هکتار	۱۰ تا ۲۰ کیلوگرم در هکتار

مرحله	نام کود	نوع کود	نوع و میزان مصرف	
			محلول پاشی	کود آبیاری
شروع میوه دهی	آمینو پلکس ۲۴ (آمینو اسید مایع)	آمینو اسید + نیتروژن ارگانیک	-----	۱ تا ۱/۵ لیتر در هکتار
	اسپیشال ۱۰-۱۰-۲۶	عناصر پر مصرف + ریز مغذی	۱ تا ۳ کیلوگرم در هکتار	-----



مرحله	نام کود	نوع کود	نوع و میزان مصرف	
			محلول پاشی	کود آبیاری
فندقی شدن میوه	SOP (سولوپتاس)	(پتاسیم + گوگرد)	۱۰ تا ۲۰ کیلوگرم در هکتار	۲ تا ۳ کیلوگرم در هکتار
	کلسیم	کلسیم مایع غنی شده	-----	۱ تا ۱/۵ لیتر در هکتار

مرحله	نام کود	نوع کود	نوع و میزان مصرف	
			محلول پاشی	کود آبیاری
درشت شدن میوه	بوستر (میکروگرانول پتاسیم)	پتاسیم + فسفر محلول	۱ تا ۳ کیلوگرم در هکتار	۱۰ کیلوگرم در هکتار

- مقادیر توصیه شده بسته به سن گیاه، زمان مصرف، وضعیت خاک، شدت کمبود، و میزان عملکرد متغیر بوده و برای اثربخشی بالاتر و حصول بهترین نتیجه، توصیه می گردد قبل از مصرف، انجام آزمایش آب، خاک و گیاه صورت گیرد.
- محلول پاشی بایستی در هوای آرام، صبح زود یا هنگام غروب انجام گیرد تا بیشترین کارایی را داشته باشد.
- در صورت نیاز به اختلاط با سایر کودها و سموم، ابتدا در سطح کوچک آزمایش شود.

تهیه شده در بخش فنی شرکت آدنا دشت